

**ACERIN Płyn na skórę, do usuwania odcisków i zgrubiałej skóry
(Acidum salicylicum + Acidum lacticum) (195 mg + 98 mg)/g**

Działanie

Kwas salicylowy działa keratolitycznie, zmiękcza i rozpułchnia zrogowaciały naskórek, ułatwiając jego złuszczenie.

Kwas mlekowy niszczy zrogowaciałą warstwę skóry.

Wskazania

Lek Acerin stosuje się do usuwania odcisków i zgrubiałej skóry.

Dawkowanie

Zewnętrznie. Lek Acerin jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę.

Namoczyć nogi w ciepłej wodzie przez 15-30 minut, a następnie po osuszeniu nałożyć pędzelkiem na odcisk lub zgrubiałe miejsce na skórze lek Acerin. Należy uważać, aby nie dotknąć zdrowej skóry.

Począć aż lek dobrze wyschnie. Nakładanie leku, w razie konieczności powtarzać przez kilka dni.

Następnie należy wymoczyć nogi i usunąć odcisk.

Skład

1 g płynu zawiera: substancje czynne: 195 mg kwasu salicylowego i 98 mg kwasu mlekowego;
substancje pomocnicze: koloksylina, kałafonia, aceton, octan n-butylu.

Przeciwwskazania:

Nie stosować leku Acerin:

- doustnie
- w nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku
- u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniami układu krążenia
- jeśli skóra w otoczeniu odciska jest uszkodzona lub zmieniona chorobowo
- u dzieci
- na twarzy i w okolicy narządów płciowych

Działania niepożądane:

Mogą wystąpić objawy podrażnienia i stan zapalny.

Zastosowanie leku na zdrową skórę może spowodować oparzenie i ból.

"Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu."